

がん化学療法レジメン情報

当院の化学療法レジメン情報を公開しています。

乳がん 小細胞肺がん 非小細胞肺がん 胃がん 大腸がん

※保険医療機関及び保険薬局の皆様

当院では、レジメンに関する照会や患者さんの状況に関する相談及び情報提供を行っています。下記にお問合わせください。

細木病院 薬剤部

TEL:088-822-7211(代表)

FAX:088-871-3810(薬剤部)

対応時間:9:00～17:30(月～金)

乳がん

2024.6

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
EC	エピルビシン	点滴	90mg/m ²	d1	21 日
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
ddEC	エピルビシン	点滴	90mg/m ²	d1	14 日
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
TC	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	21 日
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
T-mab+TC	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	
	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	d1	
DTX	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	21 日
T-mab+DTX	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d1	
PTX	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,d8,d15	28 日
ddPTX	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	14 日
VNR	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	d1,d8	21 日
GEM	ゲムシタビン	点滴	1250mg/m ²	d1,d8	21 日
Eribulin	エリブリン	点滴	1.4mg/m ²	d1,8	21 日
Bev+PTX	ベバシズマブ	点滴点滴	10mg/kg	d1,d15	28 日
	パクリタキセル		90mg/m ²	d1,d8,d15	
トラスツズマブエムタンシン (カドサイラ)	トラスツズマブエムタンシン	点滴	3.6mg/kg	d1	21 日
T-mab	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
T-mab + Pertuzumab	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
	ペルツズマブ	点滴	*2) 840mg/Body→420mg/Body	d1	
T-mab + Pertuzumab +DTX	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d 1	21 日
	ペルツズマブ	点滴	*2) 840mg/Body→420mg/Body	d 1	
	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	d 1	
T-mab + Pertuzumab +PTX	トラスツズマブ	点滴	*1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
	ペルツズマブ	点滴	*2) 840mg/Body→420mg/Body	d1	
	パクリタキセル	点滴	75mg/m ²	d1,d8,d15	
トラスツズマブデルクス テカン (エンハーツ)	トラスツズマブデルクス テカン	点滴	5.4mg/kg	d1	21 日

*1)初回は 8mg/kg、2 回目以降は 6mg/kg。ただし、前回投与から 4 週間以上空いた場合は、8mg/kg となる。

*2)初回は 840mg/Body、2 回目以降は 420mg/Body。ただし、前回投与から 6 週間以上空いた場合は、840mg/Body となる。

小細胞肺がん

2024.6

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
CBDCA + ETP	カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	21 日
	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1～d3	
NGT	ノギテカン	点滴	1m g / m ²	d1～ d 5	21 日
Durvalumab	デュルバルマブ	点滴	1500m g /Body	d1	28 日

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
CBDCA+PEM +ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	d1	21 日
	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	
	カルボプラチン	点滴	AUC × (GFR+25)	d1	
CDDP+VNR	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	d1, d 8	21 日
	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
PEM+CBDCA	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21 日
	カルボプラチン	点滴	AUC × (GFR+25)	d1	
Ram+DTX	ラムシルマブ	点滴	10mg/kg	d1	21 日
	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	
PTX+CBDCA	パクリタキセル	点滴	200mg/m ²	d1	21 日
	カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	
ペムブロリズマブ (q3w) (キイトルーダ)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	d1	21 日
ペムブロリズマブ (q6w) (キイトルーダ)	ペムブロリズマブ	点滴	400mg/body	d1	42 日

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
CDDP+TS-1	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d8	35 日
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1（夕）～d22（朝）	
Ram+PTX	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	d1, d15 d1, d8,	28 日
	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d15	
Nivo（q2w）	ニボルマブ	点滴	240mg/Body	d1	14 日
PTX	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1, d8, d15	28 日
T-mab+XP	トラスツズマブ	点滴	* 1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
	カベシタビン	内服	1000mg/m ² /回	d1（朝）～d15（夕）	
T-mab+CDDP+TS-1	トラスツズマブ	点滴	* 1) 8mg/kg→6mg/kg	d1	21 日
	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d1	
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1（朝）～d15（夕）	

*1)初回は 8mg/kg、2 回目以降は 6mg/kg。ただし、前回投与から 4 週間以上空いた場合は、8mg/kg となる。

レジメン名称	薬剤名	投与経路	投与量	投与日	1クール日数
Bev+mFOLFOX6	ベバシズマブ	点滴	10mg/kg	d1	14 日
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m ²	d1～d3	
P-mab+mFOLFOX6	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14 日
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m ²	d1～d3	
Bev+XELOX	ベバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21 日
	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
	カペシタビン	内服	1000mg/m ² /回	d1（夕）～d15（朝）	
XELOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21 日
	カペシタビン	内服	1000mg/m ² /回	d1（夕）～d15（朝）	
Bev+SOX	ベバシズマブ	点滴	7.5mg/kg	d1	21 日
	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1（夕）～d15（朝）	
Bev+FOLFIRI	ベバシズマブ	点滴	10mg/kg	d1	14 日
	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m ²	d1～d3	
Ram+FOLFIRI	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	d1	14 日
	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m ²	d1～d3	
P-mab+FOLFIRI	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	14 日
	イリノテカン	点滴	180mg/m ²	d1	
	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（急速）	点滴	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル（持続）	点滴	2400mg/m ²	d1～d3	
IRIS（q3w）	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	21 日
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1（夕）～d15（朝）	
Bev+IRIS	ベバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	28 日
	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1	
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1（夕）～d15（朝）	
P-mab+IRIS	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	d1	28 日
	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1	
	ティーエスワン	内服	80mg/m ² /day	d1（夕）～d15（朝）	